

Munkásszállók működésére vonatkozó közegészségügyi - járványügyi szabályok

- A házirendet kifüggesztés útján a munkavállalók tudomására kell hozni.
- Javasolt a munkásszállás bejáratánál és más területeken plakátok kihelyezése, amelyek felhívják a figyelmet a higiénés szabályokra és annak betartására. Ezen belül a köhögési etikett betartására, a szokásos érintkezési formák közül a kézfogás, puszi lehetőség szerinti kerülésére, a gyakori, alapos, legalább 30-40 másodpercig tartó szappanos kézmosásra, kézfertőtlenítésre, az általános higiénés előírások betartására, a felületek fokozott fertőtlenítésére.
- Indokolt naponta többször fertőtleníteni azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, liftek hívó gombja, WC lehúzó, stb.) Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők is megfelelőek.
- A munkásszálláson kialakított konyha-étkező, öltöző, tisztálkodó- és mellékhelyiségek rendszeres és fertőtlenítő takarítását meg kell oldani.
- Különös gonddal szükséges tisztítani az étkezés során használt eszközöket is.
- Takarításhoz virucid hatással rendelkező készítményeket kell használni.
- A fertőtlenítő szereket (megfelelő töménységben + időtartamig), a gyártó által feltüntetettek szerint, a kémiai biztonság általános szabályainak figyelembevételével kell alkalmazni.
- A fertőtlenítőszer Magyarországon engedélykötelesek, az országos tisztifőorvos által kiadott engedély számát fel kell tüntetni a címkén. Minden esetben csak engedéllyel rendelkező (a megfelelő hatásosságot garantáló) terméket szabad vásárolni.
- Az intézmény munkatársait folyamatosan tájékoztatni és oktatni szükséges a járvány megelőzésére szolgáló intézkedésekről, feladataikról és a betartandó szabályokról. A takarítást végző személyzetet is oktatásban kell részesíteni a felületek tisztításának, fertőtlenítésének fontosságáról, a fokozott fertőtlenítést igénylő területekről.
- A fertőtlenítő- tisztítószer zárt, elkülönített tárolását meg kell oldani.
- A vizes blokkokban a kézmosás és kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítani kell. Ajánlott a fertőtlenítő hatású folyékony szappan, mert ennek alkalmazásával egy fázisban végezhető el a kéztisztítás és a kézfertőtlenítés.
- Amennyiben kialakításra került közösségi tér (pl. társalgó) kihelyezhető érintés nélkül használható alkoholos kézfertőtlenítőszer adagoló.
- A közös helyiségekben, egyszerre csak annyi személy tartózkodjon, hogy biztosítva legyen a legalább 1,5 m-es távolság tartás. Hasznos lehet egy táblát az ajtóra elhelyezni, hogy egyszerre hány ember tartózkodhat bent. Fel kell hívni a munkásszálló lakóinak figyelmét a távolságtartás fontosságára és a csoportosulások kerülésére.

- A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemotermodezinfekciós mosási eljárással történhet.
- A kórokozók számának csökkentése érdekében naponta több alkalommal javasolt az alapos szellőztetés (ajánlatos több nyílászáró egyidejű nyitásával keresztuzat keltése) végzése.
- A hulladékot (szemetet) zártan kell gyűjteni és tárolni, rendszeresen el kell szállíttatni.
- A hulladék gyűjtésére szolgáló tartályokat, a tárolóhelyeket és környezetüket rendszeresen, de legalább hetente kell tisztítani és fertőtleníteni
- Megelőző jelleggel gondoskodni kell az egészségügyi kártevők (rovarok, rágcsálók) irtásáról.
- Természetes légcserre esetén gyakori szellőztetés javasolt az egyes helyiségekben (lakóhelyiség, szociális helyiség, közös helyiség stb.)
- A különféle légtechnikai eszközök növelhetik a kockázatot a levegő keverésével, a vírusos cseppek lebegtetésével, valamint a kórokozó szállításával. A mesterséges szellőztetés helyett, a megelőzés érdekében javasoljuk a természetes szellőztetés alkalmazását. Amennyiben a légtechnika nem kapcsolható ki, úgy szükségesnek tartjuk a tiszta, friss levegő arányának növelését a belső térben. A friss levegő pótlás minimum 10 l/s/fő legyen. A forgódobos hővisszanyerők (forgódobos hőcserélők, regiszterek) közvetíthetik a mikroorganizmust a használt és a friss levegő ág között, ezért ezeket a készülékeket mindenképpen kapcsolják ki. Kerülendő továbbá minden olyan egyéb műszaki megoldás, amely az elhasznált levegő egy részét visszajuttatja a friss levegő ágba. Továbbra is használhatók az olyan hőcserélők, ahol nincs levegő visszakeverés, amely garantálja a friss és az elhasznált levegő 100%-os elkülönítését. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, hanem csupán a belső levegőt forgatják (pl. split klíma és fan-coil berendezések), a levegőben tartják a vírusokat, így növelhetik a fertőzés kockázatát, ezért javasoljuk ezeknek a készülékek a kikapcsolását. Amennyiben ezek nem kapcsolhatók ki, gyakori fertőtlenítésük javasolt.

Teendő fertőzött lakó vagy munkavállaló esetén

- Amennyiben egy lakónál légúti fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a munkavállaló háziorvosát, aki a hatályban lévő eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
- Amennyiben az intézményben fertőzött személyt azonosítanak, akkor a közösség zárt jellege miatt fennáll a többi lakó fertőződésének kockázata is. A járványügyi vizsgálat ezért rájuk is kiterjed.
- A munkavállaló által igénybe vett szociális helyiségekben (étkező, öltöző, tisztálkodó- és mellékhelyiségek) soron kívüli fertőtlenítő takarítást javasolt alkalmazni.
- Azt a személyt, aki a fertőző betegségben szenvedő személlyel érintkezett és feltehetően maga is a betegség lappangási szakaszában van, az eljárásrendnek megfelelően járványügyi megfigyelés vagy járványügyi zárlat alá helyezheti az egészségügyi államigazgatási szerv. A járványügyi megfigyelés vagy zárlat alá

- helyezett személynek be kell tartani a népegészségügyi hatóság által elrendelt szabályokat.
- A járványügyi megfigyelés alatt álló személy köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb.), textiliát (ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) használni, azokat elkülönítve tisztítani és tárolni. A háztartási szemetet dupla zsákba helyezve kell az ajtaja elé kihelyezni, majd az üzemeltetőnek, illetve az általa megbízott személynek kell a szemetgyűjtőbe tenni.

Hajléktalan szállók működésére vonatkozó közegészségügyi-járványügyi szabályok:

- Fontos, hogy a helyzetre való tekintettel az intézményeik dolgozói és ellátottjai fokozott felelősséget tanúsítsanak egymás iránt.
- A hajléktalanellátó intézmények (főként az éjjeli menedékhellyel rendelkezők) ellátási kötelezettsége Magyarország egész területére kiterjed. Fontos, hogy az ellátottak ne utazzanak egyik városból (intézményből) a másikba az esetlegesen meglévő fertőzés terjesztésének megakadályozása érdekében.
- Az intézményekben dolgozó munkatársak szintén fokozott körültekintéssel, felelősségük tudatában tervezzék és szervezzék belföldi utazásaikat.
- Az intézményekben dolgozók magas szintű személyi higiénia kötelesek fenntartani, számukra megfelelő védőruházatot, és egyéni védőeszközöket kell biztosítani.
- A higiéniai teendőkről (a dolgozók és az ellátottak érdekében) javasolt oktatást tartani. Fontos az alapos, minden részletre kiterjedő oktatás, a munkafolyamatok pontos rögzítése.
- A takarítást végző személyzetet is oktatásban kell részesíteni a felületek tisztításának, fertőtlenítésének fontosságáról, a fokozott fertőtlenítést igénylő területekről.
- A Házirend felülvizsgálatát el kell végezni, a járványhelyzetre adaptált házirendet az ellátottak tudomására kell hozni.
- Kiemelten fontos és napjában többször is fertőtleníteni kell azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók stb.), valamint a közös, rendszeresen használt használati tárgyakat. Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők alkalmazhatóak. A fertőtlenítőszerket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.
- A vizes blokkok padló és csempe falburkolatainak, valamint klórálló burkolattal ellátott helyiségek padló burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is alkalmazhatóak, abban az esetben, ha a készítmény címkéjén a virucid hatás, illetve a virucid hatás létrejöttéhez az alkalmazási paraméterek a használati utasításban fel vannak tüntetve.

- A vizes blokkokban a kézmosás és kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítani kell. Ajánlott a fertőtlenítő hatású folyékony szappan biztosítása, mert ennek alkalmazásával egy fázisban végezhető el a kéztisztítás és a kézfertőtlenítés.
- Különös gonddal szükséges tisztítani az étkezés során használt eszközöket is.
- A fertőtlenítő- tisztítószeres zárt, elkülönített tárolását meg kell oldani.
- Amennyiben kialakításra került közösségi tér (pl. társalgó, étkező) kihelyezhető érintés nélkül használható alkoholos kézfertőtlenítőszer adagoló.
- A közös helyiségekben, egyszerre csak annyi személy tartózkodjon, hogy biztosítva legyen a legalább 1,5 m-es távolság tartás. Hasznos lehet egy táblát az ajtóra elhelyezni, hogy egyszerre hány ember tartózkodhat bent. Fel kell hívni a hajléktalanszálló lakóinak figyelmét a távolságtartás fontosságára és a csoportosulások kerülésére
- A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemo-termodezinfekciós mosási eljárással történhet.
- A kórokozók számának csökkentése érdekében naponta több alkalommal javasolt az alapos szellőztetés (ajánlatos több nyílászáró egyidejű nyitásával kereszthuzat keltése) végzése.
- A hulladékot (szemetet) zártan kell gyűjteni és tárolni, rendszeresen el kell szállíttatni.
- A hulladék gyűjtésére szolgáló tartályokat, a tárolóhelyeket és környezetüket rendszeresen, de legalább hetente kell tisztítani és fertőtleníteni
- Megelőző jelleggel gondoskodni kell az egészségügyi kártevők (rovarok, rágcsálók) irtásáról.
- Természetes légcserre esetén gyakori szellőztetés javasolt az egyes helyiségekben (lakóhelyiség, szociális helyiség, közös helyiség stb.)
- Amennyiben egy ellátottnál légúti fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az intézmény orvosát, aki a hatályban lévő eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
- Amennyiben az intézményben fertőzött személyt azonosítanak, akkor a közösség zárt jellege miatt fennáll a dolgozók és a többi ellátott fertőződésének kockázata is. A járványügyi vizsgálat ezért rájuk is kiterjed.


Idősek Otthona működésére vonatkozó közegészségügyi-járványügyi szabályok:

- Fontos, hogy a helyzetre való tekintettel az intézményeik dolgozói és ellátottjai fokozott felelősséget tanúsítanak egymás iránt,
- Az intézményekben dolgozók magas szintű személyi higiénia kötelesek fenntartani, számukra megfelelő védőruházatot, és egyéni védőeszközöket kell biztosítani.

- A higiéniai teendőkről (a dolgozók és a gondozottak érdekében) javasolt oktatást tartani. A takarítást végző személyzetet is oktatásban kell részesíteni a felületek tisztításának, fertőtlenítésének fontosságáról, a fokozott fertőtlenítést igénylő területekről.
- Fontos az alapos, minden részletre kiterjedő oktatás, a munkafolyamatok pontos rögzítése.
- A Házirend felülvizsgálatát el kell végezni, a járványhelyzetre adaptált házirendet az ellátottak tudomására kell hozni.
- Amennyire csak lehetséges, csökkentsék a gondozottak közötti kontaktust.
- Kiemelten fontos és napjában többször is fertőtleníteni kell azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók stb.) valamint a közös, rendszeresen használt használati tárgyakat. Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők alkalmazhatóak.
- A vizes blokkok padló és csempe falburkolatainak, valamint klórálló burkolattal ellátott helyiségek padló burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is alkalmazhatóak, abban az esetben, ha a készítmény címkéjén a virucid hatás, illetve a virucid hatás létrejöttéhez az alkalmazási paraméterek a használati utasításban fel vannak tüntetve.
- A vizes blokkokban illetve azokban a szobákban ahol ápolás történik a kézmosás és kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítani kell. Ajánlott a fertőtlenítő hatású folyékony szappan biztosítása, mert ennek alkalmazásával egy fázisban végezhető el a kéztisztítás és a kézfertőtlenítés.
- A fertőtlenítő- tisztítószeresek zárt, elkülönített tárolását meg kell oldani.
- Amennyiben kialakításra került közösségi tér (pl. társalgó, étkező) kihelyezhető érintés nélkül használható alkoholos kézfertőtlenítőszer adagoló.
- A közös helyiségekben, egyszerre csak annyi személy tartózkodjon, hogy biztosítva legyen a legalább 1,5 m-es távolság tartás. Hasznos lehet egy táblát az ajtóra elhelyezni, hogy egyszerre hány ember tartózkodhat bent.
- Az étkeztetés során is biztosítani kell a 1,5 méteres távolságot.
- Kézfertőtlenítési lehetőséget kell biztosítani az étteremben.
- Az étteremben az asztalokon elhelyezett „közhatalmatú” eszközök (pl. só- és borsszóró, ecetes üvegek stb.) tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni adagok biztosításával kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.
- Rendkívül fontos a fogyasztók edényeinek, evőeszközeinek, poharainak megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok cseppfertőzéstől mentes tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak fogyasztók általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával.


- Tálcaikat, használatot követően virucid fertőtlenítőszerrel mosogatni szükséges minden esetben, kenyérfoszlók tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt.
- A konyha üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.
- A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemotermodezinfekciós mosási eljárással történhet, a tiszta és szennyes textíliák keveredését ki kell zárni, a tiszta textíliák zárt szennyeződésmentes tárolását meg kell oldani.
- A kórokozók számának csökkentése érdekében naponta több alkalommal javasolt az alapos szellőztetés (ajánlatos több nyílászáró egyidejű nyitásával kereszthuzat keltése) végzése.
- A különféle légtechnikai eszközök növelhetik a kockázatot a levegő keverésével, a vírusos cseppek lebegtetésével, valamint a kórokozó szállításával. A mesterséges szellőztetés helyett, a megelőzés érdekében ezért javasoljuk a természetes szellőztetés alkalmazását. Amennyiben a légtechnika nem kapcsolható ki, úgy szükségesnek tartjuk a tiszta, friss levegő arányának növelését a belső térben. A friss levegő pótlás minimum 10 L/s/fő legyen. A friss levegő befűvését a szokásosnál néhány órával előbb el kell kezdeni, és néhány órán át tovább kell működtetni.
- A forgódobos hővisszanyerők (forgódobos hőcserélők, regiszterek) közvetíthetik a mikroorganizmust a használt és a friss levegő ág között, ezért ezeket a készülékeket mindenképpen kapcsolják ki. Kerülendő továbbá minden olyan egyéb műszaki megoldás, amely az elhasznált levegő egy részét visszajuttatja a friss levegő ágba.
- Továbbra is használhatók az olyan hőcserélők, ahol nincs levegő visszakeverés, amely garantálja a friss és az elhasznált levegő 100%-os elkülönítését.
- Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, hanem csupán a belső levegőt forgatják (pl. split klíma és fan-coil berendezések), a levegőben tartják a vírusokat, így növelhetik a fertőzés kockázatát. Javasoljuk ezeknek a készülékek a kikapcsolását. Amennyiben ezek nem kapcsolhatók ki, gyakori fertőtlenítésük javasolt.
- A hulladékot (szemetet) zártan kell gyűjteni és tárolni, rendszeresen el kell szállíttatni.
- A hulladék gyűjtésére szolgáló tartályokat, a tárolóhelyeket és környezetüket rendszeresen, de legalább hetente kell tisztítani és fertőtleníteni.
- A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak (a továbbiakban: rovarok), valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők (a továbbiakban együtt: egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról (a továbbiakban együtt: védekezés) gondoskodni kell. A nyitható ablakokat rovarhálóval kell ellátni.
- A fertőzésveszélyes egészségügyi hulladékok gyűjtése és kezelése a vonatkozó előírások szerint történhet:

- Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 1 § (1) a) pontja szerint az EMMI rendelet hatálya kiterjed minden egészségügyi szolgáltatást nyújtó természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre (továbbiakban: egészségügyi szolgáltató), valamint az egészségügyi szolgáltatónál az általa nyújtott ellátás során képződő egészségügyi hulladéokra és gyógyszerhulladéokra.
- A fertőzésveszélyes egészségügyi hulladékokat az EMMI rendelet 3. § (1) – (9) bekezdésében előírtak szerint kell gyűjteni, kezelésükre pedig az EMMI rendelet speciális egészségügyi veszélyes hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó előírásai az irányadóak: az egészségügyi szolgáltató által kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen, illetve üzemi gyűjtőhelyen elkülönítetten kell gyűjteni;
- Gyűjtési idejük hűtés nélkül legfeljebb 48 óra, míg hűtött körülmények között legfeljebb 5 °C-on – addig, amíg a gyűjtőedény megtelik, de legfeljebb 30 nap lehet;
- A fertőzésveszélyes egészségügyi hulladékok kizárólag fertőtlenítéssel kezelhetők. Ezeknek a hulladékoknak az ártalmatlanítását a kezelését végző cégek a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett, a hulladékgazdálkodási engedélyükben feltüntetett ártalmatlanítási technológiákkal végezhetik;
- A fertőzésveszélyes egészségügyi hulladékokat tartalmazó, lezárt gyűjtőedényeket a hulladék fertőtlenítéséig tilos kinyitni.
- Amennyiben egy gondozottnál légúti fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az intézmény orvosát, aki az előírt és általa ismert eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
- Amennyiben az intézményben a fertőzött személyt azonosítanak, akkor a közösség zárt jellege miatt fennáll a dolgozók és a többi gondozott fertőződésének kockázata is. A járványügyi vizsgálat ezért rájuk is kiterjed.
- Műszer-, eszközfertőtlenítés, sterilizálás: a betegellátásnál, ápolásnál alkalmazott műszerek/eszközök megfelelő tárolását, fertőtlenítését, sterilizálását biztosítani kell.


Dr. Müller Cecilia
 országos tisztifőorvos



Jóváhagyom:


Prof. Dr. Kásler Miklós
 miniszter



Budapest, 2020. .. 05.22. ..

Az eljárásrend az aláírás napján lép életbe.