

A monitor rendszerben 2009 évben jelentett *Staphylococcus aureus* törzsek antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacín	Moxifloxacin	Gentamicin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Doxycyclin	Quinupristin\ dalfopristin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim
--------------	------------	-----------	---------------	--------------	------------	----------	--------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------------------------	-----------	-----------	------------

<i>Járóbeteg mintákból izolált törzsek</i>																	
Érzékeny (%)	10,2	93,1	92,0	96,9	97,8	93,4	82,0	83,9	100,0	100,0	98,9	89,9	92,0	100,0	100,0	98,3	98,6
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1
Rezisztens (%)	89,8	6,9	7,6	2,7	2,1	6,4	17,9	16,0	0,0	0,0	1,0	9,9	7,5	0,0	0,0	1,7	1,3
Törzs (beteg)	18032	18182	16123	6676	11418	4229	18524	18465	17275	11792	4320	7114	3401	1709	3269	3912	16535

<i>Fekvőbeteg mintákból izolált törzsek</i>																	
Érzékeny (%)	9,2	78,5	75,4	83,6	94,2	89,0	71,0	73,0	100,0	100,0	96,9	89,7	92,6	99,9	99,9	96,0	97,1
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,4	1,2	0,1	0,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,1
Rezisztens (%)	90,8	21,5	24,2	15,2	5,7	10,2	29,0	26,8	0,0	0,0	3,0	10,1	6,9	0,0	0,1	4,0	2,8
Törzs (beteg)	12962	13484	11137	6113	10405	5062	13487	13437	13143	8362	3817	5474	3006	1001	2798	3403	12555