

A monitor rendszerben 2018. évben jelentett *Staphylococcus aureus* izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacín	Moxifloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim	Tigecyclin	Fuzidinsav
Járóbeteg mintákból izolált törzsek																		
Érzékeny (%)	12,9	89,4	92,3	92,8	98,8	96,3	96,0	74,6	76,1	100,0	99,9	99,2	92,9	99,9	99,3	99,3	99,9	99,8
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	87,1	10,6	7,7	7,2	1,2	3,7	4,0	25,4	23,9	0,0	0,1	0,8	7,1	0,1	0,7	0,7	0,1	0,2
Törzs (beteg)	10278	23366	21562	19166	24328	10814	7148	22936	24333	9024	6697	12123	15571	4702	7226	24044	11456	2973
Fekvőbeteg mintákból izolált törzsek																		
Érzékeny (%)	8,7	76,9	77,1	78,4	97,9	95,2	95,9	70,8	70,7	99,9	99,9	98,2	93,3	100,0	99,3	99,0	99,9	99,6
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	91,3	23,1	22,9	21,6	2,1	4,8	4,1	29,2	29,3	0,1	0,1	1,7	6,7	0,0	0,6	1,0	0,1	0,4
Törzs (beteg)	10964	18501	16777	14207	19224	11664	8859	17502	19293	9151	5458	11798	14663	4782	6603	18803	10460	2755