

A monitor rendszerben 2018. évben intenzív osztályokról származó mintákból jelentett *Staphylococcus aureus* izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacín	Moxifloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim	Tigecyclin	Fuzidinsav
Érzékeny (%)	8,2	74,1	75,4	77,3	97,9	96,4	96,5	69,9	69,4	100,0	100,0	99,0	92,7	99,9	99,2	98,6	100,0	99,4
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	91,8	25,9	24,6	22,7	2,1	3,6	3,5	30,0	30,5	0,0	0,0	1,0	7,3	0,1	0,7	1,4	0,0	0,6
Törzs (beteg)	2065	3649	3263	3089	3899	2308	1954	3243	3926	1843	1181	2897	3239	1115	1516	3817	2133	709