

A monitor rendszerben 2017. évben jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycín	Amikacin	Sumetrolim
<i>Acinetobacter baumannii</i>								
Érzékeny (%)	32,2	28,2	18,4	21,1	28,4	62,4	46,2	21,2
Mérsékelt (%)	0,9	3,2	0,0	0,1	-	-	0,0	0,3
Rezisztens (%)	66,9	68,6	81,6	78,8	71,6	37,6	53,8	78,5
Törzs (beteg)	3288	3328	3308	2164	3320	3281	3083	2274
<i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó specíesek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)								
Érzékeny (%)	88,2	86,4	78,3	82,7	83,9	86,0	84,9	71,3
Mérsékelt (%)	0,5	1,3	-	0,8	0,0	-	0,0	1,2
Rezisztens (%)	11,3	12,3	21,7	16,5	16,1	14,0	15,1	27,5
Törzs (beteg)	450	448	451	260	453	451	443	411
<i>Acinetobacter egyéb</i>								
Érzékeny (%)	94,1	91,8	83,8	84,2	88,2	88,2	87,4	82,5
Mérsékelt (%)	0,7	2,0	-	0,6	-	-	1,9	0,4
Rezisztens (%)	5,2	6,2	16,2	15,2	11,8	11,8	10,7	17,1
Törzs (beteg)	1244	1299	1097	890	1320	1289	1055	1134